

GUÍA DE AVES DE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

HUMEDALES COSTEROS DEL CENTRO SUR DE CHILE

Ministerio del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

ONU medio ambiente
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

gef

SAG
Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

CONADI
Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Gobierno de Chile

COMITÉ OPERATIVO DE BIODIVERSIDAD
ARAUCANÍA

El diseño e impresión de esta guía fue financiada por el Proyecto GEF Conservación de Humedales Costeros de la zona Centro Sur de Chile "Hotspot de Biodiversidad".

La revisión de esta guía fue realizada por profesionales de la SEREMI del Medio Ambiente, Servicios Agrícola y Ganadero y CONADI Subdirección Nacional Temuco, en el marco del trabajo del Comité Operativo de Biodiversidad de la región de La Araucanía.

Autores:
Marta Hernández Guzmán, Profesional SEREMI del Medio Ambiente
Maximiliano Ordóñez Ordóñez, Profesional SAG
Hernán Muñoz Pedraza, Profesional CONADI Subdirección Nacional Temuco
Andrés Villarroel Moncada, Ingeniero Agrónomo, Asesor externo

Diseño y Diagramación:
Rodrigo Díaz Aravena

Fotografías:
Las fotografías utilizadas en esta publicación son un aporte de Marta Hernández Guzmán y Maximiliano Ordóñez Ordóñez salvo en los casos que se indica otra autoría.

Citar este documento como:
Hernández, M.; Ordoñez, M.; Muñoz, H. & Villarroel, A. (2022). Guía de aves de los ecosistemas costeros de la región de La Araucanía. Proyecto GEF-SEC ID: 9766 (Humedales Costeros del Centro-Sur de Chile) y Ministerio del Medio Ambiente. 132 pp.

Primera Edición, Temuco 2022

GUÍA DE AVES DE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA















Reconocimiento a Manuel Gedda Ortiz

Los autores de esta guía y el Comité Operativo de Biodiversidad de la región de La Araucanía, hacen un reconocimiento póstumo a ***Manuel Gedda Ortiz*** *por su trascendente aporte al conocimiento y difusión de la biodiversidad y el patrimonio natural del país y de La Araucanía. Su legado dejó una huella que permanecerá indeleble en el tiempo.*

Agradecimientos:

Los autores de esta guía, agradecen el valioso aporte de fotografías de las siguientes personas:

- Ariel Pulgar Hughes, Fotógrafo. IG: @arielllloyd (pág: 83, 100)
- Claudia Silva Aguad, Coordinadora Nacional GEF Humedales costeros. IG: @csaguad (pág: 119)
- Christopher Momberg Pumarino, Fotógrafo. IG: @chmomberg (pág: 110)
- Fernando Novoa Galaz, Pontificia Universidad Católica de Chile, Centro UC Desarrollo Local, Campus Villarrica. (pág: 16, 20, 25, 75, 80, 91, 121)
- Jorge de la Torre Aninat, Fotógrafo. IG: @jdelatorreaninat.photography (pág: 61)
- Jorge Herreros de Lartundo, Profesional Ministerio del Medio Ambiente. IG: @lartundo (pág: 18, 19, 26, 28, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 43, 54, 58, 59, 64, 67, 74, 76, 86, 90, 95, 99, 120, 123, 125, 126)
- Jenia Jofré Canobra, Vicepresidente de CODEFF. (pág: 57)
- Leonardo Araya Valdebenito, Profesional CONAF Región de La Araucanía. (pág: 118)
- Manuel Fuentealba Barrientos, Apoyo Técnico Turismo, Municipalidad de Lonquimay. (pág: 62)
- Tomás Altamirano. IG: @toaltamirano. (pág: 60, 77, 97, 117)

Índice

Prólogo 6
Proyecto GEF de Humedales Costeros 7
Ecosistemas costeros de la región de La Araucanía 9
Las aves desde la cultura y cosmovisión Mapuche 10
Prácticas responsable de avistamiento de aves 11
Como se organiza esta guía 12
Estructura de las fichas descriptivas 13
Morfología general de las aves 14
Fichas descriptivas por especie: 15
- Accipitriformes 16
- Apodiformes 21
- Anseriformes 22
- Cathartiformes 34
- Charadriiformes 36
- Columbiformes 60
- Coraciiformes 63
- Falconiformes 64
- Galliformes 68
- Gruiformes 69
- Passeriformes 74
- Pelecaniformes 103
- Piciformes 111
- Podicipediformes 112
- Sphenisciformes 116
- Strigiformes 117
- Suliformes 122

Otras especies que se pueden observar 127
Índice de nombres comunes 128
iNaturalist Chile 130
Referencias bibliográficas 131

Prólogo

Los ecosistemas costeros en Chile permiten el desarrollo de especies de fauna y flora, muchas de ellas endémicas. En el caso del borde costero de la región de La Araucanía, se han identificado alrededor de 142 especies de aves, las que utilizan estos ambientes para alimentarse, reproducirse, nidificar o descansar, siendo particularmente relevante para el desarrollo y ciclo de vida de especies migratorias como: zarapitos, pitotoy, playeros, rayadores, entre otras. La presente guía, es un aporte del proyecto GEF de Humedales Costeros, al conocimiento y conservación de los hábitats costeros de La Araucanía, los que albergan un valioso patrimonio natural y cultural, donde es fundamental avanzar en su puesta en valor y en la integración de las comunidades locales en la gestión de su territorio.

Robert Erath
Oficial para Proyectos GEF del Programa ONU Medio Ambiente

Proyecto GEF de Humedales Costeros


La presente Guía de aves de los ecosistemas costeros de la región de La Araucanía se enmarca en el desarrollo del proyecto GEF ***"Conservación de humedales costeros de la zona centro-sur de Chile, hotspot de la biodiversidad, a través del manejo adaptativo de los ecosistemas de borde costero"***, siendo un aporte a la valorización y protección de los ecosistemas costeros del país. Este proyecto es una iniciativa liderada por el Ministerio del Medio Ambiente, implementada por ONU Medio Ambiente y financiada por el GEF (Fondo para el Medio Ambiente Mundial), cuya etapa de implementación se inició en diciembre del 2019 y tendrá una duración de 5 años.

Ecosistemas Pilotos a nivel nacional

El Proyecto GEF se encuentra focalizado en cinco humedales costeros:

- Humedal de la Desembocadura del río Elqui en la región de Coquimbo.
- Humedal de Mantagua en la región de Valparaíso.
- Humedal de Cáhuil en la región de O'Higgins.
- Humedal Rocuant-Andalién en la región del Biobío.
- Humedales del río Queule en la región de La Araucanía.

Mas información sobre el proyecto GEF:https://gefhumedales.mma.gob.cl/




Los principales objetivos del proyecto GEF de Humedales Costeros son:

- Difundir el valor de los humedales costeros, su biodiversidad y servicios ecosistémicos.
- Promover el uso sostenible y la conservación de los recursos naturales en ecosistemas costeros, para reducir su degradación.
- Incentivar la implementación de soluciones basadas en la naturaleza como una alternativa para el desarrollo local.
- Contribuir al manejo integral sostenible con enfoque de cuenca.

Piloto: Humedales del río Queule región de La Araucanía


Los humedales del río Queule se ubican en la comuna de Toltén en la región de La Araucanía. Este humedal tiene un alto valor ecológico, social y cultural, en torno a él habitan comunidades indígenas y no indígenas que dependen en gran medida de los servicios ecosistémicos generados en estos ambientes. Las principales actividades económicas desarrolladas en la zona están asociadas al rubro agroforestal, ganadero, pesca, gastronomía, turismo, artesanía, entre otros.

Es importante destacar la diversidad de ecosistemas presentes en el área, playas, dunas, estuarios, hualves y bosques, donde habitan diversas especies de flora y fauna. A lo anterior se debe sumar su historia y cultural, que hacen de este territorio un lugar muy interesante de recorrer y conocer.



Ecosistemas costeros de la región de La Araucanía

Los ecosistemas costeros de la región de La Araucanía son muy diversos, permitiendo el desarrollo de especies de fauna y flora muchas de ellas endémicas. Con respecto a las aves se han identificado alrededor de 142 especies, las que utilizan estos ambientes para alimentarse, reproducirse, nidificar o descansar como lo hacen las especies migratorias. Las áreas más atractivas para la observación de aves en el borde costero de La Araucanía son: **(1)** los **humedales del río Monkul** en la comuna de Carahue; **(2)** la **desembocadura del río Imperial** entre las comunas de Carahue y Saavedra; **(3)** los **humedales del Lago Budi** pertenecientes a las comunas de Saavedra y Teodoro Schmidt; **(4)** la **desembocadura del río Toltén** entre las comunas de Teodoro Schmidt y Toltén; y **(5)** los **humedales del río Queule** en la comuna de Toltén.



Las aves desde la cultura y cosmovisión Mapuche

Desde la cultura y cosmovisión Mapuche las aves (*Uñüm*) tienen distintas connotaciones, en primer lugar, existe una denominación de las especies en base a la imitación lingüística de su canto o sonido, cuyos nombres se denominan onomatopéyicos, ejemplos: el *churin*, *wüdwüd*, *runrún*, *koykoy*, *kawkaw*, etc.

Otra descripción tiene relación con determinados comportamientos que son interpretados como mensajes de alto contenido emocional y/o simbólico "buen o mal augurio", "riesgo, peligro o muerte", y esa percepción queda registrada en su denominación, por ejemplo, las aves nocturnas (*Kongkong*, *chucho*, *nuko*), que son anunciadoras de mal agüero, el *Keltewe* o *treile* es considerado benéfico, pues ayuda a la vigilancia de las casas anunciando la llegada de personas extrañas al lugar. A lo anterior se suman otras conductas de las aves y que determinan su nombre, por ejemplo, *pekeñ* (que mira siempre), referida a la actitud observadora característica de esta ave. La *Wala* y sus cualidades como ave zambullidora, representa a la esposa del *Shumpal* "Ser mitológico semejante a las Sirenas".

El simbolismo de las aves encuentra su más alta expresión en las analogías de la conducta de algunas especies (Pato *kutrü*, *Choyke*, *Trile*) con la organización social de la comunidad mapuche y su representación ritual en la ceremonia del *nguillatun*. El *keltewe* o *tregül* o *treyle* en la ceremonia del *nguillatun* simboliza la perspicacia de la Machi y se le representa en el baile *tregülpurun*.

Importante: cuando visites lugares en donde confluya la presencia de aves y la cultura Mapuche, averigua entre la población local lo que significan las aves para ellos, de acuerdo a su cosmovisión.

Prácticas responsable de avistamiento de aves

¡Te invitamos a tener presente las siguientes recomendaciones!

- Antes de iniciar tu viaje, averigua si existen guías locales ¡así podrás conocer más de la biodiversidad y cultura local!
- Respeta la normativa sobre protección de flora y fauna, en especial en zonas con prohibición de caza y de nidificación de aves.
- Permanece siempre en los senderos establecidos y no ingreses sin autorización a terrenos privados.
- Evita o disminuye al mínimo la utilización de grabaciones para atraer a las aves "especialmente en período de reproducción los que se indican en esta guía".
- ¡No utilices flash o linternas de alta intensidad para observar aves nocturnas, y si fuese necesario utiliza linternas con luz roja!
- Si observas bandadas o grupos de aves mantén la distancia ya que pueden asustarse, abandonar los nidos, pisotear los huevos o aplastar los pichones.
- ¡No te aproximes a los nidos! Si encuentras nidos o crías accidentalmente ¡No muevas el nido, ni manipules los pichones o volantones, sus padres pueden estar cerca!
- Prefiere el uso de escondites, refugios y torres de observación de aves si hay disponibles.
- Utiliza ropa con colores oscuros o de camuflaje, para evitar perturbar o ahuyentar a las aves.
- ¡No lleves mascotas! pueden atacar a las aves y sus nidos, o alterarlas con su presencia.
- ¡No tires basura, plástico, colillas de cigarrillos, restos de comida, mascarillas u otros! es probable que las aves la confundan con comida para ellas y/o sus crías, o queden atrapadas en dichos residuos.
- ¡No hagas avistamientos de aves con grandes grupos de personas y recuerda guardar silencio!
- Estaciona tu vehículo en lugares autorizados. ¡No ingreses con ningún tipo de vehículo a playas, dunas o humedales, son lugares de nidificación y descanso de aves!

Te invitamos a disfrutar del avistamiento de las aves, siendo responsable y cuidando de ellas.

Como se organiza esta guía

Esta guía incluye la descripción de 111 especies de aves, las que están organizadas por "Ordenes" los cuales están identificados con distintos colores según el diagrama adjunto. Cada especie es presentada en una lámina individual, describiendo aspectos como: distribución, hábitat, descripción resumida de la especie, estado de conservación, periodo reproductivo y origen de la especie, cada uno de estos contenidos están asociados a un "ícono específico" (ver página siguiente).

Por último, en esta guía prestamos especial atención al periodo reproductivo y/o primeras etapas de crecimiento de las aves (que para efectos de este documento comprende: el cortejo, nidación, alimentación de pichones, volantones, etc.), **periodo en el cual es fundamental NO molestar, ahuyentar, mover nidos, tomar pichones, etc., lo cual, pueden poner en riesgo la seguridad de las aves o de los pichones** (revisa en esta guía, las recomendaciones a tener presente para realizar un avistamiento de aves responsables).

ORDEN	COLOR
ACCIPITRIFORMES	
APODIFORMES	
ANSERIFORMES	
CATHARTIFORMES	
CHARADRIIFORMES	
COLUMBIFORMES	
CORACIIFORMES	
FALCONIFORMES	
GALLIFORMES	
GRUIFORMES	
PASSERIFORMES	
PELECANIFORMES	
PICIFORMES	
PODICIPEDIFORMES	
SPHENISCIFORMES	
STRIGIFORMES	
SULIFORMES	

Estructura de las fichas descriptivas

RCE	UICN	ESTADO DE CONSERVACIÓN
CR	CR	Peligro crítico
EN	EN	En peligro
VU	VU	Vulnerable
NT	NT	Casi amenazada
LC	LC	Preocupación menor
DD	DD	Datos insuficientes

ORIGEN	
N	Nativo
E	Endémico
EE	Exótico



Nombre común
Nombre científico
Distribución
Habitat
Descripción de la especie
Precaución
"período reproductivo"

RCE:


Las Categorías de Conservación de Especies para Chile están dadas según el Reglamento de Clasificación de Especies "RCE" (DS Nº 29 del 2011), para esta guía dichas categorías están representadas con un icono redondo (ver más: https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/).


UICN:

Para las especies que no contaban con una clasificación según el RCE en Chile, se utilizaron las categorías asignadas por la UICN, y están representadas con un icono en forma de hexágono (ver Lista Roja UICN en: www.redlist.org).

Morfología general de las aves









FICHAS DESCRIPTIVAS POR ESPECIE
(ORGANIZADAS POR ORDEN)

Aguilucho común

Geranoaetus polyosoma

N LC

Desde Arica y Parinacota a Magallanes. Desde 0 - 4000 msnm.

Ambientes abiertos, laderas, bordes de cuerpos de agua. Rapaz diurno, solitarios o en parejas.

L. 45 - 50 cm el macho y 50 - 55 cm la hembra. Pico gris oscuro con punta negra, iris café. Plumaje: variante según la edad, cola blanca con barrado gris y ancha banda subterminal negra. Fase clara: cabeza y parte superior grises, manto y escapulares castaño rojizo.

Desde agosto a marzo.





Bailarín

Elanus leucurus

N LC

Desde Atacama a Los Lagos. Desde 0 - 1800 msnm. Extensa distribución en Sudamérica.

Rapaz diurno pequeño, frecuenta ambientes abiertos, con pastizales, matorrales, bordes de cuerpos de agua.

L. 35 cm el macho y 43 cm la hembra. Pico negruzco, iris rojo anaranjado (juvenil iris amarillento) y patas amarillas. Plumaje: mayormente blanco en ambos sexos, partes superiores grisáceo pálido, coberteras negras y cola blanca.

Desde noviembre a febrero.

Vari ceniciento común

Circus cinereus

N LC

Desde Arica y Parinacota a Magallanes. Desde 0 - 2000 msnm.

Lugares abiertos, humedales, lagunas, pastizales, pajonales, trigales, borde de bosques.

L. 40 cm el macho y 50 cm la hembra (rapaz pequeño). Pico gris-azulado en la punta y base amarillenta, patas e iris amarillos. Plumaje macho: rabadilla blanca, cabeza, pecho y parte superior gris ceniciento. Plumaje hembra: cara y collarín blanquecino, parte superior café oscuro, con moteado blanquecino en coberteras alares.

Desde octubre a enero.





Peuquito

Accipiter bicolor

N LC

Desde Coquimbo a Magallanes. Desde 0 - 2250 msnm. Se distribuye ampliamente por Sud y Centro América.

Bosques y bordes aledaños a terrenos abiertos. Rapaz pequeño.

L. 38 - 42 cm. Leve dimorfismo sexual, pico y su base amarillentos, iris y patas amarillas. Plumaje adulto: corona, parte inferior castaño pálido con variegado blanco. Plumaje macho: subcaudales blancas y cola gris con barras gruesas negras. Plumaje hembra: barrado oscuro en el pecho y abdomen.

Desde octubre a febrero.

Peuco

Parabuteo unicinctus

N LC

Desde Arica y Parinacota hasta Aysén. Desde 0 - 2400 msnm.

Terrenos abiertos y bajos incluyendo pastizales quebradas semidesérticas y laderas de cerros con arbustos dispersos.

L 53 cm (rapaz mediano). Patas y cera amarillas, pico gris azulado con punta negra e iris café oscuro. Plumaje: coloración café oscuro uniforme, barra postocular café amarillenta, rabadilla y subcaudales blancas, coberteras rufo, calzones rufo oscuro (en adultos) y cola con barra terminal blanca.

Desde agosto a abril.





Picaflor (chico)

Sephanoides sephaniodes

N LC

Desde Antofagasta a Magallanes (exclusivo de Chile y Argentina). Desde 0 - 2000 msnm.

Utiliza ambientes naturales (bosques y sus bordes) y urbanos (parques y jardines), dependiendo de la disponibilidad de flores.

L. 11 cm. Es el más común de los picaflores en Chile. Pico largo, aguzado y negro, cabeza grande en relación al cuerpo, patas e iris negro, cola corta y redondeada. Plumaje: mancha postocular blanca, cuerpo verde metálico, garganta, pecho y abdomen con moteado verde y blanco. El macho se destaca por su frente y corona rojo fuego.

Desde agosto a diciembre.

Cisne coscoroba

Coscoroba coscoroba

N LC

Desde Atacama a Magallanes, visitante ocasional al norte y al sur de dicha distribución. Desde 0 - 900 msnm.

Humedales o lagunas de baja profundidad de aguas dulces o salobres, se le puede ver en pareja o grupos familiares, tiende a formar colonias.

L. 120 cm. Delgada línea negra en torno a los ojos, iris rosado, patas y pico rosado rojizo. Plumaje: de coloración general blanco, solo las puntas de las plumas primarias son de color negro, las que se pueden observar fácilmente en el vuelo.

Desde julio a febrero.





Cisne de cuello negro

Cygnus melancoryphus

N LC

Desde Antofagasta a Magallanes. Desde 0 - 1200 msnm.

Ambiente acuático: ríos, humedales y estuarios. En espacios abiertos y entre pajonales. Solitario y en grupos familiares.

L. 122 cm. Pico gris azulado, carúncula nasal roja de mayor tamaño en los machos, patas rosadas, iris oscuro. Plumaje: cuerpo blanco, cabeza y cuello negros, anillo ocular alargado hacia la nuca de color blanco.

Desde julio a abril.

Pato anteojillo

Speculanas specularis

N NT

Desde el Maule a Magallanes. Visitante ocasional hasta Valparaíso. Desde 0 - 1500 msnm.

Remansos y desembocaduras de ríos, lagunas y charcos forestados. En pareja o grupos familiares.

L. 53 cm. Pico largo gris azulado oscuro, iris café oscuro, patas naranjas. Plumaje: característica mancha blanca ovalada delante del ojo, medialuna blanca en la garganta, cabeza, espalda y alas café oscuras, parte inferior café ocre, alas con tonalidades bronce, verde y lila con bandas blancas.

Desde septiembre a enero.



Pato capuchino

Spatula versicolor

N LC

Desde Valparaíso a Magallanes. Desde 0 - 1000 msnm.

Humedales costeros y someros, lagunas, riachuelos y embalses. En pareja o pequeños grupos dispersos.

L. 53 cm. Cuello grueso y cola corta, pico azulado con la mitad basal amarilla, iris anaranjado oscuro y patas gris azuladas. Plumaje: boina negra que pasa por debajo de los ojos, parte superior café oscuro, espéculo verde con banda blanca, pecho y parte superior del abdomen ocres con escamado café oscuro, rabadilla y subcaudales grisáceos claro.

Desde septiembre a enero.

Pato colorado

Spatula cyanoptera

N LC

Desde Arica y Parinacota a Magallanes. Desde 0 - 1700 msnm.

Humedales someros de aguas dulces y salobres (vegas, lagunas y tranques) con abundante vegetación emergente.

L. 45 cm. Pato de mediano tamaño. Cuello largo y cola corta. Presenta marcado dimorfismo sexual. Macho: pico negro, iris rojo. Plumaje: rufo intenso, alas negruzcas con coberteras celestes y espéculo verde. Hembra: pico negro, patas amarillas e iris café. Plumaje: coloración ante café lavado gris, plumas de centro café oscuro con moteado denso.

Desde septiembre a febrero.





Pato cuchara

Spatula platalea

N LC

Desde Coquimbo a Magallanes. Desde 0 - 1400 msnm.

Lagunas, lagos, embalses, arroyos y costa marina. De preferencia en ambientes con abundante vegetación palustre.

L. 51 cm. Pico ancho y aplanado más largo que la cabeza, cola puntiaguda. Marcado dimorfismo sexual. Macho: pico negro, iris celeste. Plumaje: cabeza y cuello café grisáceo, cuerpo castaño con profundo moteado negro. Hembra: iris café oscuro, pico gris apizarrado oscuro. Plumaje: coloración general ante con lavado gris, con plumas de centro oscuro, moteado denso.

Desde septiembre a octubre.

Pato gargantillo

Anas bahamensis

N LC

Desde Arica y Parinacota hasta Magallanes. Desde 0 - 1000 msnm.

Cuerpos de agua dulces y salobres, riachuelos, lagunas y estuarios (ambientes con abundante vegetación). En pareja o en pequeños grupos.

L. 51 cm. Cuello delgado y cola larga, pico gris azulado con mitad basal roja, patas pardas, iris rojo. Plumaje: boina café que pasa por debajo de los ojos, mejillas, lados del cuello y garganta blancos, espalda y escapulares negruzcas bordeadas de ocre, rabadilla y cola ocre.

Desde noviembre a febrero.





Pato jergón chico

Anas flavirostris

N LC

Desde Arica y Parinacota a Magallanes. Desde 0 - 4600 msnm.

Es la especie de pato más común en Chile. Habita en lagunas, lagos, embalses, ríos, salares, desembocaduras, costas marinas y humedales urbanos.

L. 40 cm. Pato pequeño y compacto, cuello y cola corta, pico amarillo con línea central y punta negra, patas amarillentas. Plumaje: en general café grisáceo, parte inferior más pálida, cabeza y cuello oscuro, espéculo negro con verde.

Desde agosto a febrero.

Pato jergón grande

Anas georgica


N LC

Desde Arica y Parinacota hasta Magallanes. Desde 0 - 4600 msnm.

Lagunas, lagos, ríos, praderas inundadas, pantanos, costas marinas y pajonales. Se puede observar junto a otras especies de patos.

L. 51 cm. Especie de pato estilizado de cuello largo y cola puntiaguda. Pico amarillo con culmen y punta negra. Patas grises. Plumaje: coloración general café amarillenta, cabeza y parte inferior más clara, garganta más blanca, manto y lomo café oscuro con márgenes café claro.

Desde agosto a febrero.





Pato negro

Netta peposaca

N LC

Desde Atacama a Magallanes. Desde 0 - 600 msnm.

Lagunas, lagos, embalses, pantanos y arroyos. Prefiere ambientes con abundante vegetación palustre y poco profundos.

L. 55 cm. Macho: sobresaliente escudo frontal de color rojizo, pico de color rojizo más pálido hacia la punta, con macha negra en el extremo, patas anaranjadas, iris rojo. Plumaje coloración general apizarrado oscuro, cabeza y cuello negro. Hembra: pico pardo azulado sin carúncula. Plumaje: cabeza cuello y pecho pardo rufo, mentón, garganta y partes inferiores blanquecina, corona, nuca y cobertoras pardo oscuro.

Desde octubre a enero.

Pato real

Mareca sibilatrix

N LC

Desde Atacama a Magallanes. Desde 0 - 2400 msnm.

Lagos, lagunas, marismas, arroyos y ríos con escasa corriente. En pareja o grupos pequeños en época reproductiva.

L. 50 cm. Pico celeste, iris negruzco, cola y patas café claro. Plumaje: cara y parche auricular blanco, cabeza y cuello negros con brillos metálicos azul verdoso, espalda y escapulares negras bordeadas de blanco, rabadilla blanca y pecho blanco con barrado negro.

Desde julio a febrero.





Pato rinconero

Heteronetta atricapilla

N LC

Desde Valparaíso a Los Lagos y ocasionalmente en Magallanes. Desde 0 - 600 msnm.

Lagos, lagunas, tranques y pantanos de agua dulce con abundante vegetación acuática emergente.

L. 38 cm. Cola muy corta, patas grises e iris negruzco. Macho: pico gris azulado con mancha basal roja en época reproductiva. Plumaje: cabeza y cuello negros, parte superior y alas café negruzco. Hembra: pico gris pizarra. Plumaje: coloración general café grisáceo oscuro uniforme, garganta y línea ocular más clara.

Desde agosto a octubre. Es una especie parásita que ocupa los nidos de otras aves acuáticas.

Jote de cabeza colorada

Cathartes aura

N LC

Desde Arica y Parinacota a Magallanes. Desde 0 - 2500 msnm.

Terrenos abiertos con presencia de árboles o bosques cercanos, sectores agrícolas y ganaderos. Solitario o en pequeños grupos.

L. 70 cm. Base del pico y cabeza desnuda, pico color cuerno, iris café, patas grises, cabeza color rojiza, cola larga. Plumaje: coloración general café negruzco, las rémiges son gris claro, las primarias destacan por su forma de dedos en vuelo.

Desde agosto a febrero.





Jote de cabeza negra

Coragyps atratus

N LC

Desde Arica y Parinacota hasta Aysén. Desde 0 - 2000 msnm.

Terrenos abiertos en especial cerca de ciudades, basurales, y otras instalaciones humanas como puertos y caletas. Gregario, se posa en arboles, postes y otras construcciones.

L. 65 cm. Pico negro, largo, delgado con un gancho, iris café oscuro, patas grisáceas, cabeza y parte del cuello desnudo muy arrugado de color negro. Plumaje: coloración general negro con brillo metálico por encima, alas largas con raquis de las primarias blancos.

Desde agosto a octubre.

Becacina

Gallinago magellanica

N LC

Desde Atacama a Magallanes. Desde 0 - 2600 msnm.

Vegas, pantanos, turberas, pastizales húmedos o inundados, marismas costeras, bordes de ríos y lagunas. Especie solitaria y críptica.

L. 30 cm. Ave compacta de cuerpo redondeado, cola corta, pico muy largo de base amarillo verdoso con punta negra, patas gruesas de color amarillento, iris café oscuro. Plumaje: coloración general café amarillento con barrado café negruzco, pecho y flancos blanquecinos.

Desde octubre a febrero.



Chorlo chileno

Charadrius modestus

N LC

Desde Atacama a Magallanes. Migra dentro de Chile.

Playas marinas pedregosas, vegas, praderas, orillas de lagunas y otros cuerpos de agua. Solitario, en pareja o en grupos familiares. Se asocia a otros chorlos.

L. 22 cm. Chorlo grande y robusto, de cabeza y cuello corto, pico negro y delgado, patas amarillentas, iris negro. Plumaje: cintillo blanco sobre los ojos, corona café grisáceo oscuro, pecho rufo, ancha banda pectoral negra, abdomen y subcaudales blancas.

Desde octubre a febrero (nidos con crías en Tierra del Fuego).

Chorlo de doble collar

Charadrius falklandicus

N LC

Desde Antofagasta a Magallanes. Desde 0 - 800 msnm. Migra dentro de Chile.

Costas marinas pedregosas y de arena, vegas, estuarios, orillas de lagunas salobres y de agua dulce. En parejas o grupos familiares.

L. 18 cm. Chorlo robusto de cabeza grande y cuello corto, pico negro y delgado, patas gris oscuro, iris negro. Plumaje: delgada barra negra sobre la frente, corona, nuca y lado del cuello canela, frente, cuello y parte inferior blanco, collar delgado negro y banda pectoral negra gruesa.

Desde septiembre a diciembre.





Chorlo nevado

Charadrius nivosus

N VU

Desde Arica y Parinacota hasta Los Lagos. Estrictamente costero.

Playas arenosas y riberas de lagunas costeras adyacentes. En parejas o grupos familiares.

L. 16 cm. Chorlo compacto de cuello corto, pico negro corto, patas rosado pálido, iris negro. Plumaje: banda postocular, semi collar y barra gruesa sobre la frente negras, corona, nuca y parte superior gris pálido, frente, cara, parte inferior del pecho y abdomen blancas.

Desde enero a marzo.

Gaviota cáhuil

Chroicocephalus maculipennis

N LC

Desde Arica y Parinacota a Magallanes. Desde 0 - 1100 msnm.

Costas marinas, humedales interiores, estuarios, sitios arados donde se alimenta, lagos precordilleranos. Nidifica en bordes de pajonales de lagunas o ríos lénticos.

L. 39 cm. Pico y patas rojas, iris café oscuro. Plumaje adulto reproductivo: capucha negra, anillo periocular blanco, cuello, pecho, parte inferior y cola blancos, manto y dorso de color gris claro. Plumaje de reposo: parte superior gris perla claro, partes inferiores blancas, con mancha negra en auriculares.

Desde agosto a febrero.





Gaviota de Franklin

Leucophaeus pipixcan

N LC

Desde Arica y Parinacota hasta Magallanes. Desde 0 - 500 msnm. Especie migratoria.

Pelágica y costera, frecuenta lagunas, embalses y ríos, humedales bajos. En bandadas tanto en el mar como en la costa.

L. 36 cm. Iris y patas negruzcas. Plumaje: en general el cuello, pecho y parte inferior es blanco, manto y lomo gris y puntas de las primarias negras. Plumaje reproductivo: capucha negra. Plumaje no reproductivo: pico negruzco con punta roja, capucha parcial grisácea oscura.

No se reproduce en Chile.

Gaviota dominicana

Larus dominicanus

N LC

Desde Arica y Parinacota a Magallanes. Desde 0 - 1000 msnm.

Esencialmente costera, pero remonta al interior a través de los ríos, alcanzando lagos interiores, suelos agrícolas, praderas, ríos y humedales. En bandadas muy numerosas.

L. 58 cm. Pico amarillo con mancha roja en el extremo inferior, patas grises amarillentas, iris amarillo. Plumaje: cabeza, cuello, nuca, pecho y parte inferior blancos, manto y alas negro pizarra, primarias con manchas blancas. Plumaje juvenil: pico y patas negruzcas, plumaje general café ahumado con moteado café oscuro.

Desde agosto a abril.



Gaviota garuma

Leucophaeus modestus

N VU

Desde Arica y Parinacota a Los Lagos. Desde 0 - 1500 msnm.

Estrictamente costero, frecuenta playas arenosas y costas rocosas. Es endémica de la corriente de Humboldt.

L. 45 cm. Patas negras, pico largo, puntiagudo y negro, iris oscuro. Plumaje reproductivo: en general cabeza y cuerpo gris perla oscuro. Plumaje no reproductivo: capuchón café ahumado oscuro, notoria línea periocular blanca.

Desde noviembre a enero (nidifica en pleno desierto entre Tarapacá y Atacama).

Gaviotín elegante

Thalasseus elegans

N NT

Desde Arica y Parinacota a Los Lagos. Estrictamente costero. Especie migratoria.

Costero, playas arenosas y rocosas, además de estuarios, planicies intermareales en bahías y lagunas costeras.

L. 43 cm. Pico grueso y largo que varía en coloración según la temporada. Fase no reproductiva: patas oscuras con tinte rojizo, iris oscuro. Plumaje: amplia frente blanca, parte superior de la cabeza y parche ocular negruzco, manto y lomo gris uniforme, primarias grises más oscuras, partes inferiores blancas. Fase reproductiva: pico rojo anaranjado con punta más pálida. Plumaje: boina completamente negra, con vistosas plumas negras más largas en la nuca.

No se reproduce en Chile.



Gaviotín piquerito

Sterna trudeaui

N LC

Desde Atacama a Los Lagos.

Ríos, estuarios y lagunas, con abundante vegetación. Solitario o en pareja, patrullando permanentemente.

L. 32 cm. Fase reproductiva: pico naranja con franja negra y punta amarilla, patas anaranjadas, iris negruzco. Plumaje: cabeza blanca con línea ocular negra, parte superior y dorso de alas gris perla, rabadilla y parte inferior blancas.

Desde octubre a diciembre.

Gaviotín sudamericano

Sterna hirundinacea

N LC

Desde Arica y Parinacota a Magallanes (Cabo de Hornos).

Costas marinas de todo tipo: estuarios, fiordos y canales. Se les puede ver en pequeños grupos o grandes bandadas, junto a otras gaviotas o gaviotines.

L. 42 cm. Gaviotín grande de cola larga y ahorquillada. Fase reproductiva: Pico rojo y fino, iris negro, patas rojas. Plumaje: boina negra que pasa por debajo de los ojos, parte superior y alas gris perla, subcaudales blancas.

Desde noviembre a diciembre.





Perrito

Himantopus mexicanus

N LC

Desde Arica y Parinacota hasta Los Lagos. Desde 0 - 600 msnm.

Ambientes de agua dulce y salada, humedales, bordes de lagunas y lagos, desembocaduras de ríos (estuarios). Forrajea en pequeños grupos de individuos y se les puede ver junto a otras aves.

L. 42 cm. Cuerpo muy estilizado, pico largo, delgado de color negro, patas largas de rosado intenso, iris rojo oscuro. Plumaje: cara, cuello, pecho, abdomen y rabadilla blanca, parte superior negro con visos azulado metálico, línea postocular negra que llega a la nuca y lados del cuello.

Desde noviembre a marzo.

Pilpilén común

Haematopus palliatus

N NT


Desde Arica y Parinacota a Magallanes.

Estrictamente costero, playas arenosas, planicies intermareales fangosas y estuarios. En pareja o en pequeños grupos.

L. 45 cm. Pico largo, aguzado, grueso de color rojo anaranjado, iris amarillo, con anillo periocular rojo, patas gruesas rosadas pálidas. Plumaje: cabeza, cuello y parte del pecho negros, parte superior café oscuro, parte inferior, abdomen y rabadilla blancas.

Desde octubre a febrero.





Pilpilén negro

Haematopus ater

N LC

Desde Arica y Parinacota a Magallanes.

Zonas costeras con sustrato predominantemente rocoso, zona intermareal y playas arenosas. Se alimenta de moluscos, erizos entre otros.

L. 48 cm. Pico largo y grueso de color rojo anaranjado, patas gruesas de un rosado pálido, iris amarillo con anillo orbital rojo. Plumaje: cabeza, cuello y parte inferior pecho y abdomen negro, parte superior y alas de color café oscuro.

Desde agosto a febrero.

Pitotoy chico

Tringa flavipes

N LC

Desde Arica y Parinacota a Magallanes. Desde 0 - 4800 msnm. Especie migratoria.

Ambientes de aguas someras, estuarios, marismas, borde de lagos, vegas y lagunas. En grupos dispersos asociados a pitotoy grande y otras especies.

L.25 cm. Pico negruzco con base de la mandíbula amarilla, patas largas amarillas, iris negro con anillo orbital blanco. Plumaje: cabeza, cuello, parte superior y alas gris ahumado oscuro con moteado blanco, parte inferior del pecho, abdomen y subcaudales blancas.

No se reproduce en Chile.





Pitotoy grande

Tringa melanoleuca

N LC

Desde Arica y Parinacota a Magallanes. Desde 0 - 4800 msnm. Especie migratoria.

Ambientes de aguas someros, incluyendo estuarios y marismas, orillas de lagos y ríos. Es una especie solicitaría o forma pequeños grupos. Migra a Sudamérica en el invierno boreal.

L.32 cm. Pico negruzco largo (de tamaño mayor que la cabeza), patas amarillas largas con rodillas gruesas, iris negro con anillo orbital blanco. Plumaje: cabeza, parte superior y alas gris ahumado oscuro con moteado blanco fino en barras, abdomen y subcaudales blancas, flancos con barrado oscuro.

No se reproduce en Chile.

Playero blanco

Calidris alba


N LC

Desde Arica y Parinacota a Magallanes. Especie migratoria.

Playas arenosas, estuarios, planicies intermareales. Especie que se agrupa en bandadas numerosas y compactas, muy raro verla solitaria.

L. 20 cm. Cuerpo compacto, pico largo, aguzado negro, patas e iris negro. Plumaje no reproductivo: parte superior gris ceniciento, plumas cobertoras blanquecinas con café, cara, pecho y parte inferior blanco.

No se reproduce en Chile.





Queltehue

Vanellus chilensis

N LC

Desde Atacama a Magallanes. Desde 0 - 2200 msnm.

Ambientes de vegas, praderas, centros urbanos, estuarios y ríos. Muy territorial, agresivo y ruidoso. Se le ve solitario, en pareja o formado bandadas.

L. 36 cm. Pico delgado rosado con punta negra, patas rosadas, iris rojo, presencia de espolón. Plumaje: cabeza y cuello gris, frente, parte anterior del cuello y pecho de color negro, partes superiores gris verdosa con brillos metálicos bronceado, vientre, flancos y subcaudales blancas, cola negra con blanco en la base y punta, mechón fino negro en la nuca.

Desde julio a enero.

Rayador

Rynchops niger

N LC

Desde Arica y Parinacota a Magallanes (visitante regular de verano). Especie migratoria.

Ambientes de aguas someras, estuarios, vegas, playas arenosas y lagunas. Es una especie que migra en grandes bandadas, se le puede ver asociadas a otras aves como gaviotas y gaviotines.

L. 45 cm. Pico largo, muy grueso de color negro con base roja, pequeñas patas rojas, iris negro, cola corta, alas muy largas y puntiagudas. Plumaje: boina negra que pasa por debajo de los ojos, parte superior y alas negras, frente, cara y parte inferior (cuello abdomen y subcaudales) blancos.

No se reproduce en Chile.





Zarapito de pico curvo

Numenius phaeopus

N LC

Desde Arica y Parinacota a Magallanes. Especie migratoria.

Costas marinas arenosas y/o fangosas y estuarios. Se le puede observar en ríos hacia el interior.

L. 44 cm. Pico muy largo y curvo, de base rosada con punta negra, patas grisáceas, iris oscuro. Plumaje: cabeza, cuello y partes superiores café claro con jaspeado café oscuro, dos bandas negras a lo largo de corona y nuca, con banda ocular oscura, abdomen blanquecino, rabadilla y cola con barrado negruzco.

No se reproduce en Chile.

Zarapito de pico recto

Limosa haemastica

N LC

Desde Arica y Parinacota a Magallanes. Especie migratoria.

Playas arenosas, costas marinas, lagos, lagunas, vegas, estuarios y riberas de ríos. Es una especie gregaria y se asocia a otras especies playeras.

L. 39 cm. Grande y estilizado, patas negruzcas, pico largo y recto (con punta negra y base rosada), iris negro. Plumaje: coloración general gris ahumado uniforme, dorso escapulares y coberteras grises con escamado fino claro, abdomen y subcaudales blanco.

No se reproduce en Chile.





Chorlo de campo

Oreopholus ruficollis

N NT

Desde Arica y Parinacota a Magallanes. Desde 0 - 4000 msnm. Migra dentro de Chile.

Se observa en praderas con arbustos y árboles dispersos en valles y laderas de cerros y también en zonas esteparias. Es menos frecuentes en áreas costeras.

L.25 cm. Pico largo negro, iris negro, patas rosadas, cabeza grande y cuello largo. Plumaje: coloración general gris cafesoso, corona gris oscura, línea negra que nace en el pico, pasa por el ojo y llega a la nuca, parche en la garganta rojizo anaranjado y parche negro en el abdomen que es blanquecino, parte superior café amarillento con jaspeado negruzco.

Desde septiembre a octubre.

Chorlo de collar

Charadrius collaris

N NT

Desde Arica y Parinacota a Los Lagos. Desde 0 - 1000 msnm.

Orillas de playas arenosas, playas pedregosas, lagunas y zonas húmedas sin vegetación.

L. 16 cm. Pico negro, patas rosado anaranjado, iris negro. Plumaje: frente blanca, corona anterior negra, corona posterior, nuca y cuello acanelado, garganta, cuello anterior, pecho y abdomen blancos, barra negra desde el pico al ojo, barra gruesa negra en el cuello (collar), pecho, dorso y cubiertas alares cafés, grisáceo y acaneladas.

Desde septiembre a diciembre.





Playero de Baird

Calidris bairdii

N LC

Desde Arica y Parinacota a Magallanes. Desde 0 - 5000 msnm. Especie migratoria.

Zona costera e interiores. Playas, ríos, lagunas, esteros, salares, zonas arenosas con poca vegetación.

L. 14 - 16 cm. Iris negro, pico largo fino negro, patas largas negras. Plumaje: cabeza café claro con variegado negruzco, con barra blanquecina desde el pico hasta la nuca pasando sobre el ojo, lomo parduzco, garganta, abdomen y flancos blanquecinos, dorso pardo oscuro moteado de café negruzco, pecho blanquecino con rayitas oscuras.

No se reproduce en Chile.

Paloma doméstica

Columba livia

EE LC

Desde Arica y Parinacota a Magallanes, incluidas las islas de Pascua, Juan Fernández. Desde 0 - 4000 msnm.

Abundante en ciudades, pueblos y plazas, también en paisajes agrícolas y ganaderos. Especie gregaria.

L. 35 cm. Pico negruzco, con carúnculas pálidas, patas rojas e iris naranjo. Plumaje: coloración general gris perla, capuchón gris pizarra, colores iridiscentes en el cuello y bandas negras en las alas.

Hasta cuatro nidadas en un año.





Torcaza

Patagioenas araucana

N LC

Desde Atacama a Magallanes (en esta última región es accidental). Desde 0 - 1500 msnm.

Principalmente en bosque Valdiviano, de Araucarias y esclerófilo. También se les puede observar ocasionalmente en pueblos. Gregaria o en pequeñas bandadas. Es una especie arbórea.

L. 37 cm. Pico negro, patas rojas, cola larga, iris naranja. Plumaje: coloración general púrpura uniforme, franja blanca y parche verde en la nuca, cobertoras alares gris pizarra y rémiges negras.

Desde diciembre a marzo.

Tórtola común

Zenaida auriculata

N LC

Desde Arica y Parinacota a Magallanes. Desde 0 - 3900 msnm.

Gran variedad de ambientes, zonas abiertas, agrícolas, pastizales, matorrales o bosques dispersos. Muy abundante en áreas urbanas. Especie gregaria.

L. 26 cm. Pico negro con carúncula gris, patas rojas e iris claro con delgado anillo orbital azulado. Plumaje: coloración general café grisáceo uniforme, parches iridiscentes en lados del cuello, alas oliváceas con óvalos negros en cobertoras.

Zona sur: desde diciembre a marzo. Zona central: desde octubre a febrero.





Martín pescador

Megaceryle torquata

N LC

Desde Biobío a Magallanes. Desde 0 - 1000 msnm.

Orilla de ríos, esteros, lagos y humedales. Se posa en árboles, cables y puentes para capturar sus presas. Solitario, en pareja o en grupos familiares.

L. 44 cm. Pico gris oscuro recto y macizo, patas grisáceas e iris negro intenso. Plumaje: cabeza gris azulado oscuro, pecho y abdomen rojo (macho), cuello, garganta y nuca blanco, mancha blanca en parte delantera del ojo, cola negra con barrado blanco. Hembra: solo abdomen rojo.

Desde noviembre a diciembre.

Cernícalo

Falco sparverius

N LC

Desde Arica y Parinacota a Magallanes. Desde 0 - 4500 msnm.

Bordes de bosques, sectores abiertos con pastizales y matorrales, sectores costeros y ciudades. Solitario o en pareja, acecha sus presas desde ramas altas y postes.

L. 25 cm. Cabeza grande y cola larga, cera y patas amarillas, pico gris azulado y punta negra, iris café oscuro. Plumaje macho: cabeza azulada, alas con manchas negras, parte superior canela con barrado negro y cola rojiza. Plumaje hembra: parte inferior blanca con jaspeado café, alas negruzcas con barrado canela, cola rojiza con bandas negras y delgadas.

Desde septiembre a febrero.





Tiuque

Milvago chimango

N LC

Desde Atacama a Magallanes. Desde 0 - 1800 msnm.

Borde de bosques, espacios abiertos, pastizales, zonas aradas, ciudades, humedales y borde costero. Gregario, pero también se le ve solitario o en pareja.

L40 cm. Pico corneo con base azulado, patas amarillentas (macho) y grises (hembras), iris café. Plumaje: coloración general entre café oscuro y café acanelado, cola delgada con barrado café amarillento, rabadilla blanquecina, línea superciliar café oscuro.

Desde septiembre a diciembre.

Traro - Carancho común

Caracara plancus

N LC

Desde Arica y Parinacota a Magallanes. Desde 0 - 2000 msnm.

Sectores abiertos, zona costera, humedales, sectores cordilleranos vecinos a bosques y asentamientos humanos. Solitario, en pareja o en grupos.

L. 58 cm. Cuerpo robusto, alas largas y cuadradas, cera naranja, pico color cuerno con base azulada, patas amarillas anaranjadas, iris café. Plumaje: corona negra, cuello y auriculares café amarillento, pecho y manto blanquecino con fino barrado café y alas café oscuro con escamado blanco.

Desde septiembre a febrero.





Halcón peregrino

Falco peregrinus

N LC

Desde Arica y Parinacota a Magallanes. Desde 0 - 3500 msnm.

Se le encuentra en todo tipo de ambientes, tales como: ambientes forestados, valles, acantilados, costas marinas, estuarios y humedales.

L. macho 41 cm y hembra 47 cm. Pico azulado, cera, párpados y patas amarillas. Plumaje: coloración general blanco con negro, alas largas y puntiagudas, cabeza, parte posterior del cuello, parte alta del dorso y alas de color negro, frente, garganta, centro del cuello, pecho y parte del abdomen beige con barras transversales gris oscuras.

Desde julio a agosto.

Codorniz

Callipepla californica


EE LC

Desde Tarapacá hasta Aysén. Desde 0 - 2300 msnm.

Terrenos secos con matorrales, áreas con cultivos y quebradas.

L. 26 cm. Plumaje macho: cara y garganta negra, cuello y pecho gris apizarrado, delgado collar y cintillo blanco, frente amarilla, abdomen con escamado café, se destaca su copete largo de plumas negras. Plumaje hembra: colores más apagados y copete pequeño (corto) de color negro.

Desde septiembre a diciembre.





Pidén

Pardirallus sanguinolentus

N LC

Desde Arica y Parinacota a Magallanes. Desde 0 - 3500 msnm.

Zonas con vegetación a orillas de lagos, lagunas, pantanos, esteros y ríos.

L. 38 - 40 cm. Pico largo (algo curvado), rojo en la base, azulado en el medio y verdoso en la punta, patas rojas en época reproductiva y verdosas el resto del año, iris rojo. Plumaje: por encima color pardo oliváceo, cara, cuello, pecho y abdomen gris ceniciento.

Desde octubre a enero.

Tagua común

Fulica armillata

N LC

Desde Coquimbo a Magallanes. Desde 0 - 2600 msnm.

Lagunas, ríos, desembocaduras de ríos, tranques, embalses.

L. 50 - 55 cm. Pico y escudete frontal amarillo, con barra roja negruzca en el centro, iris rojo oscuro, patas olivácea. Plumaje: color general gris oscuro, cabeza y cuello negro. Los juveniles son grises.

Desde octubre a enero.





Tagua chica

Fulica leucoptera

N

LC

Desde de Arica y Parinacota hasta Magallanes. Desde 0 - 3000 msnm.

Lagunas, ríos, desembocaduras de ríos, tranques, embalses y zonas inundadas.

L. 43 cm. Escudo frontal redondeado y sobresaliente de color amarillo limón o naranja, pico amarillo suave con punta amarilla, patas amarillas, iris rojo. Plumaje: coloración general apizarrado oscuro, cabeza y cuello negro.

Desde septiembre a enero.

Tagua de frente roja

Fulica rufifrons


N LC

Desde Atacama a Los Lagos, es escaso en Magallanes. Desde 0 - 800 msnm.

Lagos, lagunas, ríos y pantanos semi abiertos con abundante vegetación acuática, ocasionalmente cerca de la costa.

L.46-48 cm. Escudo frontal alargado hacia atrás de color rojo oscuro, pico color amarillo, patas amarillo verdosas, iris rojos. Plumaje: cabeza y cuello negros, cuerpo negruzco ceniciento, más claro en el pecho y abdomen oscuro.

Desde septiembre a octubre.





Tagüita

Porphyriops melanops

N LC

Desde Atacama a Los Lagos. Desde 0 - 1000 msnm.

Lagunas con pajonales, ríos de aguas tranquilas, lagos, esteros y humedales.

L. 28 - 30 cm. Pico y escudo frontal verde amarillento, patas verdes amarillentas, iris rojo. Plumaje: cabeza y cuello gris, cara negruzca, dorso y cubiertas alares pardo a castaño, flancos pardos con pequeñas manchas blancas, pecho gris.

Desde octubre a noviembre.

Churrete costero

Cinclodes nigrofumosus

E LC

Desde Arica y Parinacota a Los Ríos.

Endémico, exclusivamente de ambientes costeros. En zona intermareal de playas rocosas y arenosas y en desembocadura de ríos.

L. 27 cm. El más grande de los churretes que viven en Chile. Pico negro, patas gris oscuras. Plumaje: coloración general café obscuro, algo más clara en la parte inferior, con banda en el ala de color café amarillento, garganta blanca, estrías blancas en las partes inferiores, cola del mismo color del dorso con plumas externas café amarillento.

Desde agosto a febrero.





Colilarga

Sylviorthorhynchus desmursii

N LC

Desde Valparaíso a Magallanes. Desde 0 - 1200 msnm.

Propio del bosque valdiviano en áreas de sotobosque denso y con gran cantidad de quila y zonas arbustivas.

L. 24 cm. Pico largo y aguzado grisáceo, iris oscuro, patas grisáceas. Plumaje: frente café rojizo, partes superiores café acanelado, partes inferiores de color café amarillentas, con abdomen más claro. Ave inconfundible por su larga cola, tiene seis plumas en tonalidades café, las centrales muy largas el doble de su cuerpo, las que siguen la mitad de la longitud y las plumas externas muy cortas.

Desde noviembre a febrero.

Cachudito

Anairetes parulus

N LC

Desde Antofagasta a Magallanes. Desde 0 - 2000 msnm.

Vive en matorrales de valles, laderas semiáridas en la precordillera, zonas arbustivas, áreas de humedales, estepa patagónica, en parques y jardines.

L. 11 cm. Patas y pico negro, iris blanquecino. Plumaje: cabeza negra, frente, nuca, garganta y auriculares estriadas de blanco, con cresta negra eréctil, dorso gris oliváceo, pecho y abdomen blanquecino con líneas longitudinales negras con tintes amarillentos en la parte inferior, cola y alas negras.

Desde agosto a enero.





Chercán común

Troglodytes aedon

N LC

Desde Arica y Parinacota a Magallanes. Desde 0 - 3500 msnm.

Campos cultivados, matorrales, dunas costeras, quebradas, faldeos de la cordillera, bosques, humedales y zonas urbanas.

L. 12 cm. Pico negruzco, patas café y iris café oscuro. Plumaje: cabeza y dorso color canela claro, garganta, pecho y abdomen blanquecino acanelado, alas canela algo rojizas con barras oscuras, cola parda algo rojiza con barras transversales negruzcas.

Desde agosto o septiembre.

Chercán de las vegas

Cistothorus platensis

N LC

Desde Atacama a Magallanes. Desde 0 - 1000 msnm.

Vegas, pajonales, pantanos, áreas de matorral vecino a terrenos inundados y riberas de ríos.

L. 11 - 12 cm. Pico y patas córneos e iris negruzco. Plumaje: cabeza parda con estrías negras, dorso pardo variegado con rayas negras y blanquecinas, pecho y abdomen café claro, primarias negras, cola café con barritas negras.

Desde agosto a septiembre.





Chincol

Zonotrichia capensis

N LC

Desde Arica y Parinacota a Magallanes Desde 0 - 2000 msnm.

Campos, matorrales, humedales, parques, jardines y huertos.

L. 14 - 16 cm. Patas rosadas, pico córneo grisáceo, iris café. Plumaje: cabeza parte superior gris, plumas de la corona levantadas a modo de copete, dos bandas laterales negras, anillo alrededor del cuello color rufo (que no se une en el pecho), lomo y manto pardo con líneas longitudinales negras, cola parda.

Desde septiembre.

Chirihue

Sicalis luteola

N LC

Desde Atacama hasta Aysén. Desde 0 - 1500 msnm.

Campos agrícolas, prados abiertos, bordes de humedales y lagunas con pajonales, áreas de matorrales, sectores vecinos a zonas urbanas.

L. 14 - 15 cm. Pico gris, corto y cónico, patas gris rosáceas. Plumaje macho: cabeza y parte inferiores amarillo uniforme, corona, nuca y cuello trasero de igual color, con fino jaspeado, nuca y auriculares gris ahumado, manto y coberteras alares grisáceo con estriado oscuro, rabadilla amarillenta. Plumaje hembra: partes inferiores más grisáceas y menos amarillas que el macho.

Desde septiembre a marzo.



Churrete

Cinclodes patagonicus

N LC

Desde Coquimbo a Magallanes. Desde 0 - 2500 msnm.

Ambiente asociados a cuerpos de agua, zonas costeras, áreas forestadas, praderas y parques.

L. 18-22 cm. Pico café córneo, iris café, patas café rojizas. Plumaje: partes superiores de color café oscuro, partes inferiores café grisáceo, cabeza con ceja blanca que se prolonga hasta la nuca, garganta blanquecina con líneas café grisáceas, pecho y parte superior del abdomen con estrías blanquecinas, alas con barra café rojiza.

Desde septiembre a diciembre.

Colegial

Lessonia rufa

N LC

Desde Atacama a Magallanes. Desde 0 - 1000 msnm.

Terrenos bajos, vegas, orillas de lagunas, sectores de dunas, lechos de ríos y esteros.

L. 11 - 13 cm. Pico negro, corto y aguzado, patas negras, iris negro. Plumaje macho: coloración general negro, con destacado manto y escapulares anaranjados. Plumaje hembra: partes superiores café, con mancha dorsal café anaranjada, partes inferiores café grisáceas, cola negra.

Desde septiembre a octubre.



Cometocino patagónico

Phrygilus patagonicus

N LC

Desde Valparaíso a Magallanes. Desde 0 - 1500 msnm.

Quebradas con vegetación densa con arbustos semilleros, bosques y renovales, jardines y parques.

L. 15 - 16 cm. Pico gris pálido, patas rosáceas, plumas subcaudales blancas. Plumaje macho: cabeza, alas y cola grises apizarrado, manto castaño anaranjado, lomo y rabadilla amarilla, abdomen amarillo intenso en el centro. Plumaje hembra: cabeza gris, alas color café negruzco con fino ribete gris en cada pluma, cuerpo amarillo oliváceo, abdomen gris pálido.

Desde noviembre a febrero.

Diuca

Diuca diuca

N LC

Desde Antofagasta a Magallanes. Desde 0 - 3000 msnm.

Matorrales, quebradas, praderas, bordes de ríos, bosques, jardines y plazas urbanas.

L. 17 - 18 cm. Pico cónico de color gris, patas oscuras. Plumaje: coloración general gris perla, cabeza, cuello, dorso y pecho gris apizarrado, garganta, bajo pecho y abdomen blancos, cola negruzca con borde blanco, calzones rufos y subcaudales con borde rufo, borde orbital blanco incompleto.

Desde agosto a febrero.



Diucón

Pyrope pyrope

N LC

Desde Antofagasta a Magallanes. Desde 0 - 2000 msnm.

Bosques abiertos, matorrales, tierras cultivadas, bordes de humedales, jardines y parques.

L. 21 cm. Pico negro, corto y aguzado, patas negras, iris rojo en el adulto. Plumaje: cabeza, cuello y dorso gris ceniciento, corona apizarrada, primarias y secundarias casi negras, con ribete gris claro, garganta blanca, cola gris negruzca con borde blanco, pecho y abdomen gris claro.

Desde octubre a enero.

Dormilona tontita

Muscisaxicola maclovianus

N LC

Desde Arica y Parinacota a Magallanes. Desde 0 - 1500 msnm.

Valles, praderas, costas, zonas de humedales y montañas, orillas de ríos, esteros y lagos.

L. 16 cm. Pico negro y corto, patas negras, iris café oscuro. Plumaje: corona y barbilla con difuso parche castaño, cabeza y parte superior gris cafesoso, alas café ahumado oscuro, cola negruzca, garganta, pecho y abdomen gris blanquecino, coberteras y rémiges con fina línea gris pálido, característica región periocular oscura.

Desde septiembre a marzo.





Fío-fío

Elaenia albiceps

N LC

Desde Arica y Parinacota a Magallanes. Desde 0 - 2000 msnm. Especie migratoria.

Bosques, selva valdiviana, zonas arbustivas, jardines, huertos y terrenos cultivados.

L. 15 cm. Pico, patas e iris negruzcos. Plumaje: cabeza con cresta eréctil de centro blanco, partes superior gris oliváceo, garganta y pecho grises, centro de abdomen blanco, anillo orbital blanco oliváceo, alas café negruzcas con dos bandas blanquecinas, cola gris oscuro.

Desde noviembre a enero.

Gorrión

Passer domesticus

EE LC

Desde Arica y Parinacota a Magallanes y en las islas de Pascua y Juan Fernández. Desde 0 - 3000 msnm.

Especie introducida ampliamente distribuida en distintos ambientes rurales y urbanos.

L. 16 - 17 cm. Pico aguzado corto y cónico, patas rosáceas, iris café oscuro. Plumaje macho: cabeza gris olivácea, máscara, garganta y parte superior del pecho negros, mejillas claras, partes inferiores blanco sucio con los flancos grises, dorso pardo con castaño y negro. Plumaje hembras: cabeza y nuca café grisácea, línea amarillenta sobre el ojo, abdomen blanco con tintes parduzco, dorso en tonos café.

Desde abril a agosto.





Jilguero

Spinus barbatus

N LC

Desde Atacama a Magallanes. Desde 0 - 1500 msnm.

Vive asociado a quebradas, planicies, faldeos de cerros, donde existen matorrales y arboledas, terrenos cultivados, jardines y parques.

L. 14 cm. Pico corto, cónico de color grisáceo, patas gris-rosadas. Plumaje macho: color general amarillo oliváceo, corona y barbilla negra, abdomen amarillo con tintes verdosos, coberteras mayores negras, bordeadas de amarillo oliváceo, parte baja del abdomen blanco, cola negra. Plumaje hembra: similar al macho, sin corona y garganta negra, partes inferiores más verdosas que amarillentas.

Desde septiembre.

Loica

Leistes loyca

N LC

Desde Atacama a Magallanes. Desde 0 - 2500 msnm.

Sectores con arbustos, bordes de bosques, sectores húmedos, terrenos cultivados, praderas, jardines y parques.

L. 26 - 28 cm. Pico pardo oscuro y puntiagudo, patas pardas. Plumaje macho: parte superiores café con estrías más oscuras, garganta, pecho y parte superior del abdomen de color rojo. Plumaje hembra: es de color más pálido, parte superior del pecho café con estrías negras, garganta blanca, resto del pecho y abdomen rojo pálido.

Desde septiembre a noviembre.





Mirlo

Molothrus bonariensis

EE LC

Desde Arica y Parinacota hasta Aysén, ocasionalmente en Magallanes. Desde 0 - 2000 msnm.

Terrenos agrícolas, áreas de matorral, jardines y parques urbanos.

L. 19 - 21 cm. Ambos sexos tienen pico corto, cónico de color gris, iris café, patas negras. Plumaje macho: completamente negro con brillo tornasolado azul violeta en el cuerpo y cabeza, alas y cola con brillo tornasolado verdoso. Plumaje hembra: café ahumado uniforme, más clara en las partes inferiores. Plumaje juvenil: igual a la hembra.

Ave de costumbres parasitarias, no construye nidos, aprovecha el de otras especies.

Run run

Hymenops perspicillatus

N LC

Desde Atacama a Magallanes. Desde 0 - 1200 msnm.

Totorales, juncales, vegas, bordes de ríos, lagunas y pantanos.

L. 16 cm. Macho: pico amarillo, iris negro con grueso y destacado anillo periocular amarillo, patas café oscuro. Plumaje: completamente negro, primarias blancas con punta y base negras. Plumaje hembra: dorso café oscuro, plumas centrales negras y ribete color canela. Partes inferiores amarillentas con estrías longitudinales en el pecho. Alas con mancha café rojiza y coberteras negras con punta café amarillentas, cola negra con borde café amarillento.

Desde octubre a noviembre.





Siete colores

Tachuris rubrigastra

N LC

Desde Antofagasta hasta Aysén, accidental hasta Magallanes. Desde 0 - 1000 msnm.

Juncales, totorales, lagunas, tranques, vegas y esteros.

L. 11 cm. Patas y pico negro, iris celeste. Plumaje: parte superior de la cabeza color negro con mancha roja en la corona, bandas amarillas desde las fosas nasales hasta la nuca, zona que rodea el ojo y auriculares de color azul negruzco, partes superiores de color verde bronceado obscuro, garganta blanca, pecho y abdomen amarillo, subcaudales rojo carmesí, alas negras con ancha banda blanca. El plumaje de la hembra es de coloración más suave.

Desde septiembre a diciembre.

Tordo

Curaeus curaeus

N LC

Desde Atacama a Magallanes. Desde 0 - 2500 msnm.

Matorral y borde de bosques, zonas agrícolas, áreas costeras, sectores vecinos a humedales, pueblos y ciudades.

L. 26 - 28 cm. El macho y la hembra son iguales, poseen pico negro, aguzado y largo, cola larga y cuadrada, patas largas y negras, iris negro. Plumaje: coloración general negro brillante, es fácil de confundir con el mirlo macho, pero dicha especie es más pequeña.

Desde octubre a diciembre.





Trabajador

Phleocryptes melanops

N LC

Desde Arica y Parinacota a Magallanes. Desde 0 - 1500 msnm.

Zonas de humedales, ríos y lagunas, con abundantes juncos o totoras.

L. 13 - 14 cm. Pico y patas café. Plumaje: cabeza parda oscura con gran línea superciliar blanquecina, dorso negruzco con manchas grises, garganta, pecho y abdomen blanquecinos, alas gris obscuro con banda castaño rufo, con moteado del mismo color en las coberteras, cola café con plumas externas, partes inferiores blanco sucio con teñido cafesoso.

Desde octubre a enero.

Trile

Agelasticus thilius

N LC

Desde Atacama a Magallanes. Desde 0 - 1000 msnm.

Pajonales y juncales a orillas de ríos, lagos, lagunas, tranques y humedales.

L. 19 - 21 cm. Macho: Pico negro largo y aguzado, patas negras, iris negro. Plumaje: coloración general negro oscuro brillante, característico codo del ala amarillo, muy notorio en vuelo. Hembra: pico grisáceo, patas negras. Plumaje: coloración general café grisáceo con estrías más oscuras, mancha amarilla en el codo del ala más reducida que en el macho.

Desde octubre a enero.



Rayadito

Aphrastura spinicauda

N

LC

Desde Coquimbo a Magallanes. Desde 0 - 2000 msnm.

Bosques templados del sur. Localmente en tierras bajas, áridas con matorral.

L. 13 - 15 cm. Pico oscuro, corto y fino. Plumaje: cabeza negra, superciliar amarillenta desde la base del pico a la nuca, dorso parduzco, lomo rufo amarillento, garganta blanca, pecho y abdomen blanquecino, alas oscuras con base rojiza, coberteras negras con bordes café amarillento.

Desde noviembre a diciembre.

Tijeral

Leptasthenura aegithaloides

N LC

Desde Arica y Parinacota a Magallanes. Desde 0 - 2000 msnm.

Zonas arbustivas, incluyendo plazas y jardines urbanos.

L. 16 cm. Pico corto y puntiagudo de color negro, patas grises, iris oscuro. Plumaje: corona y nuca pardo oscuro con líneas café claro, notoria línea superciliar blanca, garganta, cuello delantero y pecho superior central blanquecinos, cola café negruzca muy larga y graduada.

Desde septiembre a octubre.



Viudita

Colorhamphus parvirostris

N LC

Desde Coquimbo a Magallanes. Desde 0 - 1000 msnm.

Claros de bosques, matorrales, bordes de bosques y áreas cercanas al agua.

L. 16 cm. Pico fino, corto y negro, patas negras, iris grande negruzco. Plumaje: corona y nuca pardo oscura con líneas café claro, notoria línea superciliar blanca, garganta, cuello delantero y pecho superior central blanquecinos.

Desde noviembre a febrero.

Rara

Phytotoma rara

N LC

Desde Atacama a Magallanes. Desde 0 - 2700 msnm.

Habita en bosques abiertos, zonas arbustivas, sectores agrícolas, jardines y parques en las ciudades.

L. 19 a 20 cm. Pico corto y grueso, iris rojo. Plumaje macho: frente y corona café rojizas, partes superiores café oliváceas con estrías negras, alas negras con bandas blancas, partes inferiores café rojizas, plumas centrales de la cola oscuras, el resto con manchas café rojizas. Plumaje hembra: partes superiores café oliváceo con estrías negras, mentón y garganta café amarillentos, pecho anaranjado, alas con dos barras angostas café amarillentas.

Desde octubre a enero.



Tenca

Mimus thenca

N LC

Desde Atacama a Los Lagos. Desde 0 - 2500 msnm.

Se observa en zonas de arbustos y matorrales, orillas de bosques, humedales, quebradas, cerros y también en ambientes de jardines y parques en ciudades.

L. 28 cm. Pico y patas negruzco, iris café oscuro. Plumaje: sin dimorfismo sexual, partes superiores gris y café terrosa, ceja blanca, partes inferiores gris cafesosa pálida, cola larga de color café oscura con mancha blanca en el borde terminal externo .

Desde noviembre.

Zorzal

Turdus falcklandii

N LC

Desde Antofagasta a Magallanes. Desde 0 - 2000 msnm.

Campos, praderas, zonas de cultivos, jardines y parques de ciudades.

L. 26- 29 cm. Pico grueso amarillo, iris negruzco con fina línea periocular amarilla, patas amarillas. Plumaje: parte superior de la cabeza y auriculares negras, con las plumas de la frente café claro. Partes superiores gris oscuro con tinte oliváceo, garganta blanquecina con estrías negras, pecho y abdomen pardos blanquecinos algo amarillento, subcaudales café claro, alas y cola negras.

Desde septiembre a octubre.



Bandurria

Theristicus melanopis

N LC

Desde Antofagasta a Magallanes. Desde 0 - 3000 msnm.

Zonas pantanosas, orillas de lagos y lagunas, en campos arados y praderas, muy común en áreas urbanas.

L. 74 cm. Iris y patas rojizas, pico largo y encorvado de color grisáceo, carúncula negra bajo el pico. Plumaje: cabeza y cuello color anaranjado suave o amarillento, frente, corona y nuca de color café castaño oscuro, pecho blanquecino, primarias, garganta y dorso pardo grisáceo con escamado pardo oscuro.

Desde octubre a diciembre.

Cuervo de pantano

Plegadis chihi

N NT

Desde Antofagasta a Los Lagos. Desde 0 - 800 msnm.

Vegas, pantanos, totorales, juncales, bordes de lagos y lagunas.

L. 56 cm. Pico largo y encorvado de color rosado grisáceo suave, iris rojizo, patas largas rojizas oscuras. Plumaje: cabeza, cuello y partes inferiores de color castaño púrpura brillante, el dorso del mismos color con reflejos metálicos verdosos, alas y cola parda con reflejo bronceado, banda blanca alrededor de la base del pico que pasa por detrás de los ojos.

Desde diciembre a enero.



Garza grande

Ardea alba

N LC

Desde Arica y Parinacota a Magallanes. Desde 0 - 1000 msnm. Ocasional hasta los 4000 msnm.

Orillas y partes bajas de ríos, lagos, lagunas, tranques, pantanos y esteros, humedales de agua dulce y salobres.

L. 85 cm. Pico largo, grueso y amarillo, iris amarillo, piernas y patas negras, cuello muy largo. Plumaje: completamente blanca, con plumas que sobresalen (más largas) en el pecho y en la parte de la cola.

Desde noviembre a diciembre.

Garza chica

Egretta thula

N LC

Desde Arica y Parinacota a Los Lagos, accidental hasta Magallanes. Desde 0 - 2000 msnm.

Orillas y partes bajas de ríos, lagos, lagunas, tranques, pantanos y esteros, humedales de agua dulce y salobres y lagos andinos.

L. 50 cm. Cuello largo, iris amarillo, pico negro y largo con base amarilla, piernas largas (por delante negras y amarillas por detrás), patas amarillas. Plumaje: totalmente blanco, con plumas largas en la cabeza, dorso y pecho, que son más visibles en la época de reproducción.

Desde noviembre a diciembre.





Garza cuca

Ardea cocoi

N LC

Desde Tarapacá a Magallanes. Desde 0 - 1000 msnm.

Orillas de lagos, lagunas, ríos, embalses, tranques, playas marinas, humedales.

L. 120 cm. Es la garza más grande en Chile. Pico largo y grueso de color amarillo anaranjado, patas anaranjadas, iris amarillo. Plumaje: corona y nuca negra, con vistosas plumas largas en la nuca del mismo color, resto de la cabeza, cuello y partes inferiores blancas, dorso y coberteras gris azulados, alas y cola negras.

Desde julio a diciembre.

Huairavo

Nycticorax nycticorax

N LC

Desde Arica y Parinacota a Magallanes. Desde 0 - 4500 msnm.

Ríos, esteros, vegas, bordes de lagos, estuarios y aguas de poca profundidad.

L. 56 - 57 cm. Patas amarillentas, iris rojo, pico largo gris oscuro. Plumaje: dorso y lomo negro con brillo verdoso metálico, partes inferiores gris pálido o blanquecino, alas grises, tiene 2 a 3 plumas blancas que salen de la parte posterior de la cabeza. Plumaje juvenil: pardo con líneas longitudinales blancas.

Desde octubre a diciembre.



Pelícano

Pelecanus thagus

N NT

Desde Arica y Parinacota a Los Lagos. Accidentalmente en Magallanes.

Zona costera, islas e islotes.

L. 127 cm. Pico largo amarillento en su base con lados y punta rojizos, patas grises, gran bolsa gular azulosa. Plumaje: cabeza blanca con tonos amarillentos, cuello blanco, base del pico y garganta negros, cuerpo oscuro muy manchado de blanco, alas oscuras con estriado blanco.

Desde septiembre a marzo.

Huairavillo

Ixobrychus involucris

N LC

Desde Coquimbo a Los Lagos. Desde 0 - 800 msnm.

Ambientes pantanosos con bastante totora y juncos.

L. 33 - 36 cm. Pico amarillo verdoso con base rojiza, patas amarillas verdosas, iris amarillo. Plumaje: cabeza parda clara con franja negra delgada en la cabeza y nuca, zona inferior blanquecina con líneas longitudinales pardo anaranjadas, primarias y secundarias negruzcas.

Desde octubre a noviembre.



Pitío

Colaptes pitius

N LC

Desde Atacama a Magallanes. Desde 0 - 2000 msnm.

Faldeos, campos y bosques abiertos, bordes de bosques, desde la costa hasta la precordillera.

L. 33 cm. Pico negruzco y largo, patas grisáceas, iris amarillo. Plumaje: frente, corona y nuca gris apizarrada, color general del cuerpo con barras café negruzcas y café amarillento por encima, lados de la cara y garganta cafe claro, dorso y abdomen color amarillento.

Desde octubre a noviembre.

Blanquillo

Podiceps occipitalis


N LC

Desde Arica y Parinacota a Magallanes. Desde 0 - 4000 msnm.

Lagos, lagunas, embalses, ríos tranquilos y estuarios.

L. 28 cm. Pico negro delgado y puntiagudo, iris rojo. Plumaje: color gris ceniciento, parte inferior blanca, lados de la cabeza con penacho de plumas finas de color gris amarillento, parte anterior del cuello y pecho blanco.

Desde septiembre a octubre.





Huala

Podiceps major

N LC

Desde Atacama a Magallanes. Desde 0 - 2200 msnm.

Lagos, lagunas, ríos, estuarios y embalses.

L. 78 cm. Pico largo y negro ligeramente encorvado hacia arriba, cuello largo, iris rojizo. Plumaje: parte anterior del cuello café rojizo y su parte posterior color pizarra, penacho eréctil negro sobre la cabeza, dorso negro grisáceo, partes inferiores blancas, barra blanca en las secundarias (solo visibles en el vuelo), subcaudales rojizas.

Desde octubre.

Picurio

Podilymbus podiceps


N LC

Desde Atacama a Magallanes. Desde 0 - 900 msnm.

Lagos, lagunas, ríos, embalses, tranques.

L. 31 cm. Pico corto y ancho de color gris con una banda negra vertical, patas grises oscuras, cuello largo, iris negruzco con anillo periocular blanco. Plumaje: lados de la cabeza y cuello gris apizarrado, frente y mentón negro, flancos, subcaudales y abdomen blanquecinos.

Desde septiembre a diciembre.





Pimpollo

Rollandia rolland

N LC

Desde Arica y Parinacota a Magallanes. Desde 0 - 4500 msnm.

Lagos, lagunas, embalses, tranques, desembocaduras de ríos y zonas costeras.

L. 26 cm. Pico negro, iris rojo, patas gris verdosas. Plumaje: dorso color negro con plumas bordeadas de café, cabeza y cuello negro con brillos metálicos, penachos en las auriculares de color blanco con algunas plumas negras, abdomen rojizo mezclado con gris blanquecino, alas negras con banda transversal blanca.

Desde septiembre a diciembre.

Pingüino de Magallanes

Spheniscus magellanicus

N LC

Desde Atacama a Magallanes.

En ambientes pelágicos costeros y en islotes rocosos.

L. 73 cm. Pico negro y robusto, aplanado verticalmente con banda transversal gris claro, patas rosadas con manchas negras, iris negro con anillo orbital rosado. Plumaje: cabeza y partes posterior negras, cuello y partes anteriores, flancos y subcaudales blanca, en el pecho una "U" invertida negra.

Desde octubre a abril.



Chuncho

Glaucidium nana

N LC

Desde Atacama a Magallanes. Desde 0 - 2000 msnm.

Habita en bosques, matorrales, parques y jardines de ciudades. Difícil de ver a pesar de sus costumbres diurnas.

L. 20 - 21 cm. Ojos grandes de iris amarillos, pico corto ganchudo de punta amarillenta, patas amarillas. Plumaje: cabeza y partes superiores parduzcas con finas líneas blancas, partes inferiores blancas con líneas longitudinales cafés, cola con bandas transversales de color castaño y café oscuro, subcaudales blancas.

Desde septiembre a noviembre.

Tucúquere

Bubo virginianus

N LC

Desde Arica y Parinacota a Magallanes. Desde 0 - 4200 msnm.

Bosques, matorrales, construcciones antiguas, desde la cordillera a la costa. Es una especie principalmente nocturna.

L 48 - 50 cm. Pico negro alargado, grandes ojos de color amarillo con marcado delineado negro, fuertes y gruesas patas cubiertas de plumas, en la zona auricular destacan plumas que asemejan orejas. Plumaje: en general es jaspeado de café a café oscuro, cara con plumas más claras, con bordes más oscuros, cuello blanquecino, pecho y abdomen en tonos más claros con barrado café oscuro, subcaudales beige, cola con barras café más oscuras.

Desde septiembre a marzo.



Pequén

Athene cunicularia

N LC

Desde Arica a Parinacota a Los Lagos. Desde 0 - 4000 msnm.

Terrenos arenosos, dunas costeras, faldeos de montañas con poca vegetación o matorral bajo en la precordillera, praderas con vegetación baja. Ave de hábitos diurnos.

L. 26 cm. Iris amarillo con línea periocular negra, pico amarillento, piernas claras con fino plumaje. Plumaje: amplia superciliar blanquecina, partes superiores de color café con manchas crema, pecho, abdomen y flancos de color blanco crema con barras café, calzones y tarsos emplumados de color café claro.

Desde octubre a diciembre.

Nuco

Asio flammeus

N LC

En Arica y Parinacota, y desde Atacama a Magallanes. Desde 0 - 600 msnm.

Vegas, pajonales de lagunas, terrenos bajos y pantanosos.

L. 42 cm. Pico córneo, iris amarillo, patas amarillas emplumadas. Plumaje: cabeza y partes superiores de pardo oscuro a negruzco con moteado claro, cara blanquecina con destacado anillo negro alrededor de cada ojo, parte inferior crema amarillenta con líneas longitudinales castaño oscuro, cola corta con gruesas barras negruzcas.

Desde octubre y abril.





Concón

Strix rufipes

N NT

Desde Valparaíso a Magallanes. Desde 0 - 1000 msnm.

Bosques maduros, altos, húmedos y densos. Ave de hábitos nocturnos.

L. 38 cm. Pico córneo, patas emplumadas de color castaño, ojos (iris) muy grandes de color café oscuro intenso, cabeza redondeada. Plumaje: disco facial redondeado blanquecino y marginado de color café oscuro, destacado plumaje canela en parte de los ojos hacia las auriculares, partes superiores café oscuro con variegado blanco, alas negruzcas con moteado blanquecino, calzones castaños.

Desde octubre a enero.

Lile

Phalacrocorax gaimardi

N NT

Desde Arica y Parinacota a Magallanes.

Costas e islas adyacentes. También en canales e islas protegidas.

L. 60 cm. Pico amarillo con base roja anaranjada, patas rojas anaranjadas, iris calipso. Plumaje: cabeza, cuello, abdomen, lomo gris oscuro, escamado blanco en escapulares y coberteras, parche blanco redondeado a cada lado del cuello.

Desde octubre a enero.





Piquero

Sula variegata

N LC

Desde Arica y Parinacota a Los Lagos.

Zona de la costa, y mar afuera.

L. 74 cm. Pico y patas gris azulado, iris rojo. Plumaje adulto: cabeza, cuello y partes inferiores blancas, alas, lomo y cola parda con variegado blanco, cola larga terminada en punta. Plumaje juvenil: cabeza y cuerpo ocre, abdomen con variegado café oscuro.

Desde enero a febrero.

Yeco

Phalacrocorax brasilianus

N LC


Desde Arica y Parinacota a Magallanes. Desde 0 - 4500 msnm.

Ambientes de agua dulce y salada, templadas y frías. En la zona costera, en ríos, lagos y vegas. También se puede observar en lagos andinos.

L. 70 - 75 cm. Pico largo con gancho de color gris amarillento, patas negras, iris calipso. Plumaje: totalmente negro brillante. En fase reproductiva presenta plumas finas blancas en la cara, garganta y alrededor del pico. Plumaje juvenil: todo el cuerpo es café ahumado.

Durante todo el año, con mayor frecuencia en primavera.





Guanay

Phalacrocorax bougainvillii

N NT

Desde Arica y Parinacota a Magallanes.

Zonas costeras y canales.

L. 74 - 76 cm. Pico largo de color córneo, patas rosadas color carne, iris rodeado de piel desnuda roja, con línea periocular de color grisáceo. Plumaje: garganta, cuello (parte anterior) y partes inferiores blancas. Cabeza, cuello (parte posterior), lomo, flancos y parte externa de los muslos de color negro con brillo violeta. En fase reproductiva se ven plumas eréctiles en la cabeza y plumas finas debajo del ojo y en el cuello.

Principalmente desde noviembre a diciembre.

Cormorán imperial

Phalacrocorax atriceps

N LC

Desde Biobío a Magallanes.

Zona costera y sus islas. También en aguas interiores.

L. 75 cm. Pico grisáceo con gancho, notorias carúnculas amarillas, patas rosadas, iris oscuro con anillo orbital azul rey. Plumaje: frente, corona, nuca, cuello trasero, dorso, lomo y piernas de color negro, garganta, mejillas, cuello delantero, pecho, abdomen, subcaudales y flancos de color blanco, alas negras con mancha blanca en las cobertoras, cresta eréctil.

Desde octubre a diciembre.

Otras especies que se pueden observar

Otras aves posibles de observar en la zona costera de la región de La Araucanía:

1. Bailarín chico (*Anthus correndera*)
2. Cachaña (*Enicognathus ferrugineus*)
3. Choroy (*Enicognathus leptorhynchus*)
4. Chorlo ártico (*Pluvialis squatarola*)
5. Chorlo dorado (*Pluvialis dominica*)
6. Chorlo semipalmado (*Charadrius semipalmatus*)
7. Chucao (*Scelorchilus rubecula*)
8. Churrete acanelado (*Cinclodes fuscus*)
9. Churrín (*Scytalopus magellanicus*)
10. Flamenco chileno (*Phoenicopterus chilensis*)
11. Gallina ciega (*Systellura longirostris*)
12. Garza boyera (*Bubulcus ibis*)
13. Golondrina chilena (*Tachycineta leucopyga*)
14. Golondrina de dorso negro (*Pygochelidon cyanoleuca*)
15. Golondrina bermeja (*Hirundo rustica*)
16. Halcón perdiguero (*Falco femoralis*)
17. Hued-hued del sur (*Pteroptochos tarnii*)
18. Lechuza (*Tyto alba*)
19. Pato rana de pico delgado (*Oxyura vittata*)
20. Perdiz chilena (*Nothoprocta perdicaria*)
21. Perdicita (*Thinocorus rumicivorus*)
22. Pilpilén austral (*Haematopus leucopodus*)
23. Playero ártico (*Calidris canutus*)
24. Playero grande *(Tringa semipalmata*)
25. Playero manchado (*Actitis macularius*)
26. Playero semipalmado (*Calidris pusilla*)
27. Playero vuelvepiedras (*Arenaria interpres*)
28. Playero de las rompientes (*Calidris virgata*)
29. Pollito de mar rojizo (*Phalaropus fulicarius*)
30. Pollito de mar tricolor (*Phalaropus tricolor*)
31. Tórtola Cuyana (*Columbina picui*)

Índice de nombres comunes

Aguilucho común 16
Bailarín 17
Bandurria 103
Becasina 36
Blanquillo 112
Cachudito 76
Cernícalo 64
Cisne coscoroba 22
Cisne de cuello negro 23
Codorniz 68
Colegial 82
Colilarga 75
Cometocino patagónico 83
Concón 121
Cormorán imperial 126
Cuervo de pantano 104
Chercán común 77
Chercán de las vegas 78
Chincol 79
Chirihue 80
Chuncho 117
Churrete 81
Churrete costero 74
Chorlo chileno 37
Chorlo de doble collar 38
Chorlo de campo 57
Chorlo de collar 58
Chorlo nevado 39
Diuca 84
Diucón 85
Dormilona tontita 86
Fío-fío 87
Garza chica 106
Garza cuca 107
Garza grande 105
Gaviota cáhuil 40
Gaviota de Franklin 41
Gaviota dominicana 42
Gaviota garuma 43
Gaviotín elegante 44
Gaviotín piquerito 45
Gaviotín sudamericano 46
Gorrión 88
Guanay 125
Halcón peregrino 67
Huairavillo 110
Huairavo 108
Huala 113
Jilguero 89
Jote de cabeza colorada 34
Jote de cabeza negra 35
Lile 122
Loica 90
Martín pescador 63
Mirlo 91
Nuco 120
Paloma doméstica 60

Pato anteojillo 24
Pato capuchino 25
Pato colorado 26
Pato cuchara 27
Pato gargantillo 28
Pato jergón chico 29
Pato jergón grande 30
Pato negro 31
Pato real 32
Pato rinconero 33
Pelícano 109
Pequén 119
Perrito 47
Peuco 20
Peuquito 19
Picaflor chileno (chico) 21
Picurio 114
Pidén 69
Pilpilén común 48
Pilpilén negro 49
Pimpollo 115
Pingüino de Magallanes 116
Piquero 123
Pitío 111
Pitotoy chico 50
Pitotoy grande 51
Playero blanco 52
Playero de Baird 59
Queltehue 53
Rara 100
Rayadito 97
Rayador 54
Run run 92
Siete colores 93
Tagua común 70
Tagua chica 71
Tagua de frente roja 72
Tagüita 73
Tordo 94
Tenca 101
Tijeral 98
Torcaza 61
Tórtola común 62
Tiuque 65
Trabajador 95
Traro - Carancho común 66
Trile 96
Tucúquere 118
Vari ceniciento común 18
Viudita 99
Yeco 124
Zarapito de pico curvo 55
Zarapito de pico recto 56
Zorzal 102

Sé parte de iNaturalist y contribuye al conocimiento de la biodiversidad de Chile.



¿Qué es iNaturalist?

Es una plataforma que permite fomentar la observación de la naturaleza, así como el registro y divulgación de la biodiversidad de cada territorio. Por lo tanto, te invitamos a sumarte a esta red nacional e internacional, subiendo tus fotografías de flora y fauna a la plataforma iNaturalist y así contribuirás al conocimiento de la biodiversidad de tu territorio, región, país o donde te encuentres.

¿Cómo hacerlo?

Es muy simple:

1) descarga desde: **https://inaturalist.mma.gob.cl** la aplicación de iNaturalist en tu celular;

2) regístrate y sé parte de iNaturalist;

3) sube tus observaciones de flora, fauna (aves, insectos, anfibios, reptiles, mamíferos, peces, etc.).

4) invita a otros como tú a ser parte de esta plataforma de ciencia ciudadana.

¡Te esperamos!

Referencias Bibliográficas

- Araya, B.; Mödinger, G. & Holman, M. (1996). Sexta Edición Guía de Campo de Aves de Chile. Editorial Universitaria. 405 pp.
- Couve, E.; Vidal, C. & Ruiz, J. (2016). Aves de Chile - Sus Islas Oceánicas y Península Antártica. FS Editorial /Far South Expeditions Ltda., Punta Arena, Chile. 551 pp.
- Hernández, M.; Bejcek, A. & Muñoz, A. (2020). Humedales: La importancia de su valorización y conservación en la región de La Araucanía. CEA Ediciones. 80 pp.
- Jaramillo, A. (2005). Aves de Chile, Ilustrado por Peter Burke y David Beadle. Ingoprint, S.A. Barcelona. 240 pp.
- Medrano, F.; Barros, R.; Norambuena, HV.; Matus, R. & Schmitt, F. (2018). Atlas de las Aves Nidificantes de Chile. Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile. Santiago, Chile. 670 pp.
- SAG. (2018). Cartilla Ley N° 19.473 y su Reglamento. XIX Edición.108 pp.
- Villagran, C.; Villa, R.; Hinojosa, LF.; Sánchez, G.; Romo, M.; Maldonado, A.; Cavieres, L.; La Torre, C.; Cuevas, J.; Castro, S.; Papic, C. & Valenzuela, A. (1999). Etnozoología Mapuche: un estudio preliminar. Revista Chilena de Historia Natural 72: 595-627.

Páginas web revisadas:

- www.avesdechile.cl
- https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/
- https://ebird.org/chile/explore
- http://especies.mma.gob.cl
- https://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm
- www.redlist.org
- https://www.redobservadores.cl/



Ministerio del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

ONU medio ambiente
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

gef

SAG
Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

CONADI
Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Gobierno de Chile

COMITÉ OPERATIVO DE BIODIVERSIDAD
ARAUCANÍA